

Le Liparis de Loesel

Une orchidée discrète des marais alcalins

Le Liparis de Loesel est une petite orchidée verdâtre, d'une quinzaine de cm ; elle est inféodée aux zones humides pauvres en nutriments et en bon état de conservation.

Sa germination et son développement, comme pour beaucoup d'espèces, dépendent de la présence de champignons mycorhiziens dans le sol. La littérature indique qu'il affectionne la végétation ouverte mais des observations en Auvergne-Rhône-Alpes montrent également de fortes densités de Liparis dans des cladaies denses. Régressions constatées et menaces avérées sur les populations de Liparis ont conduit le Ministère à mettre en place un Plan national d'actions sur cette espèce. Une déclinaison d'actions a été élaborée au niveau régional.

le saviez-vous ?

Au sein d'une même population, le nombre d'individus visibles est très variable d'une année à l'autre ; le Liparis est ainsi considéré comme une espèce à éclipse. Ces variations d'effectifs dépendent de nombreux facteurs. Les pseudobulbes peuvent aussi se déplacer à la surface de l'eau par flottaison !



Tourbières alcalines de la EN du Grand-Lemps (38) : un habitat favorable à l'espèce

Actions et découvertes en Auvergne-Rhône-Alpes

Suivi par transects de 14 populations (participant à l'échantillon national) par les conservatoires d'espaces naturels, les associations, les réserves naturelles... Exemple de suivi du Liparis dans l'Ain



Marais de Léchères à Ceignes (01) et Teppes

Exemple de gestion d'une parcelle accueillant du Liparis, par fauche et exportation



Le marais d'Enfer à Saint-Jorioz (74)

La région Auvergne-Rhône-Alpes abrite une cinquantaine de stations de Liparis en France, malgré la régression récente constatée. Des actions de gestion, de prospection, de suivi... voire de réintroduction sont menées par les gestionnaires des sites et le conservatoire botanique national alpin.



Les plus grandes populations sont préservées par des réserves naturelles nationales : Le marais de Lavours (01) et les tourbières du Grand-Lemps (38)




Marais de Lavours (01)

Aire de répartition de l'espèce
Source donnée : CBNA et CBNMC



Etang de Malserved (38)

Découverte en 2017 d'une population au sein d'un ENS départemental sur les Abrets en Dauphiné.



Val d'Ainan (38)

Programme de mise en culture et de réintroduction d'une population de Liparis en relation avec les champignons mycorhiziens.

Poursuivre les actions en cours


Le maintien du Liparis de Loesel et de ses habitats en bon état de conservation passe par le maintien des actions en cours sur les sites gérés, et par la surveillance des stations sur les sites non gérés. Parmi les actions prioritaires :

- le suivi des populations par un protocole commun se poursuit sur les 14 populations de l'échantillon national présentes en Auvergne-Rhône-Alpes ;
- l'opération de réintroduction dans le Val d'Ainan sera finalisée en 2018 par la transplantation des individus sur les sites d'accueil inoculés en champignons mycorhiziens ;
- les actions de gestion par fauche ou pâturage menées par les Conservatoires d'Espaces Naturels sur les sites gérés sont maintenues ;
- l'acquisition de parcelles et la mise en place de convention de gestion sur les populations de Liparis n'en bénéficiant pas encore restent des priorités pour les gestionnaires concernés ;
- la mutualisation des expériences et la coordination de l'ensemble des actions en faveur du Liparis se poursuivent dans le prolongement de la déclinaison du PNA.



Le liparis petite orchidée discrète ...

Des habitats à sauvegarder pour une espèce fragile !



crédits photo : V. BONNET A. MIKOLAJCZAK, G. PACHE (CBNA) - N. DAVID (CEN74) - M. PARACHOUT (Evierroute)
rédacteurs : V. BONNET (CBNA)
conception graphique : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Mission communication - sept. 2017

