


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

AIN



Typologie des aquifères


- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- niveau en baisse
- niveau en hausse
- niveau stable
- pas de données
- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- indéterminé


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

ALLIER



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

DROME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021


ISERE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▼ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

-  niveau en baisse
-  niveau en hausse
-  niveau stable
-  pas de données
-  Niveau très haut
-  Niveau haut
-  Niveau modérément haut
-  Niveau autour de la moyenne
-  Niveau modérément bas
-  Niveau bas
-  Niveau très bas
-  indéterminé

Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puys Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont

Alluvions de l'Allier amont

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021


RHONE

niveau des nappes


- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ▼ niveau en baisse | Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | Niveau haut |
| ● niveau stable | Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |

Typologie des aquifères

- | |
|--|
| Alluvions fluviales récentes |
| Alluvions anciennes et fluvioglacières |
| Domaine sédimentaire |
| Intensement plissé |
| Domaine karstique |
| Edifice volcanique |
| Socle cristallin |
| Imperméable localement aquifère |




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021 SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

HAUTE-SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'août 2021

