


**RETENUE DE BAROT (COMMUNE DE GRANDRIF, 63)**  
Carte de répartition des frayères à Truite potentielles (voir tableau)














Surface de la frayère ≈    ● 0,1 m<sup>3</sup>                      ● 0,2 m<sup>3</sup>                      ● 0,3 m<sup>3</sup>                      ● 0,9 m<sup>2</sup>







**RETENUE DE BAROT (COMMUNE DE GRANDRIF, 63)**  
 Carte des habitats et des enjeux environnementaux (flore et faune)



**Type habitat :** Contours approximatifs (par exemple : présence d'ourlets de transition non cartographiables à cette échelle)

- |   |   |
|---|---|
|  "Lande" à fougère aigle   |  Herbier à prêle, de pleine eau  |
|  Aulnaie fontinale (des niveaux bas, sous le taillis de sycomores associé) |  Herbier à glycérie (+ scirpe des bois, etc.)  |
|  Saussaie cendrée (marécageuse)  |  Plantations (épicéas ou peupliers)  |
|  "Prairie" hygrophile à mésoxérophile, fauchée (spontanée)                 |  Habitats rudéralisés (voirie, dépôts rapportés, et leurs abords, inclus talus et fossé occupés par de jeunes sycomores) |
|  Prairie humide subatlantique (du Filipendulion ou Calthion) mésotrophe    |  Absence de motif = zone hors aire d'étude ou récemment perturbée  |
|  Sources et ruisselets d'eaux douces à cardamines                          |   |

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  | Lézard des souches (reproduction) |
|  | Odonates (reproduction)           |
|  | Grenouille rousse (pontes)        |
|  | Arbre à conserver                 |