



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

AIN



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

DROME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019


HAUTE-SAVOIE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Typologie des aquifères

- | |
|---|
| ■ Alluvions fluviales récentes |
| ■ Alluvions anciennes et fluvioglaciaires |
| ■ Domaine sédimentaire |
| ■ Intensement plissé |
| ■ Domaine karstique |
| ■ Edifice volcanique |
| ■ Socle cristallin |
| ■ Imperméable localement aquifère |



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

ISERE



Typologie des aquifères


- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglaciaires
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

niveau des nappes


- | | |
|---|--|
| niveau en baisse | Niveau très haut |
| niveau en hausse | Niveau haut |
| niveau stable | Niveau modérément haut |
| pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

RHONE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019 SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

ALLIER



Typologie des aquifères


-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|--|---|
|  niveau en baisse |  Niveau très haut |
|  niveau en hausse |  Niveau haut |
|  niveau stable |  Niveau modérément haut |
|  pas de données |  Niveau autour de la moyenne |
| |  Niveau modérément bas |
| |  Niveau bas |
| |  Niveau très bas |
| |  indéterminé |


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de novembre 2019

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|--|---|
|  niveau en baisse |  Niveau très haut |
|  niveau en hausse |  Niveau haut |
|  niveau stable |  Niveau modérément haut |
|  pas de données |  Niveau autour de la moyenne |
| |  Niveau modérément bas |
| |  Niveau bas |
| |  Niveau très bas |
| |  indéterminé |

Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puys Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont

Alluvions de l'Allier amont

