


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020


HAUTE-SAVOIE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |

Typologie des aquifères

- | |
|---|
| ■ Alluvions fluviales récentes |
| ■ Alluvions anciennes et fluvioglaciaires |
| ■ Domaine sédimentaire |
| ■ Intensement plissé |
| ■ Domaine karstique |
| ■ Edifice volcanique |
| ■ Socle cristallin |
| ■ Imperméable localement aquifère |



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020


ISERE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ▽ niveau en baisse | Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | Niveau haut |
| ● niveau stable | Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |


Typologie des aquifères

- | | |
|--|--|
| | Alluvions fluviales récentes |
| | Alluvions anciennes et fluvioglacières |
| | Domaine sédimentaire |
| | Intensement plissé |
| | Domaine karstique |
| | Edifice volcanique |
| | Socle cristallin |
| | Imperméable localement aquifère |



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

PUY-DE-DOME

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ▽ niveau en baisse | Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | Niveau haut |
| ● niveau stable | Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |


Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puy Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Ailier amont

Alluvions de l'Ailier amont


Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

RHONE



Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglaciaires
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|---|--|
| niveau en baisse | Niveau très haut |
| niveau en hausse | Niveau haut |
| niveau stable | Niveau modérément haut |
| pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020


SAVOIE

Typologie des aquifères


-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
|  | niveau en baisse |  | Niveau très haut |
|  | niveau en hausse |  | Niveau haut |
|  | niveau stable |  | Niveau modérément haut |
|  | pas de données |  | Niveau autour de la moyenne |
| | |  | Niveau modérément bas |
| | |  | Niveau bas |
| | |  | Niveau très bas |
| | |  | indéterminé |




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

AIN



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

ALLIER



Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglaciaires
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|--|--|
| niveau en baisse | Niveau très haut |
| niveau en hausse | Niveau haut |
| niveau stable | Niveau modérément haut |
| pas de données | Niveau autour de la moyenne |
| | Niveau modérément bas |
| | Niveau bas |
| | Niveau très bas |
| | indéterminé |

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de septembre 2020

DROME

